

SÅ GÖR VI PÅ INFEKTIONSKLINIKEN KLOKA KLINISKA VAL

5 do not - sluta göra

1. Provtagning

Undvik dubbelprovtagning eller provtagning som inte är relevant för målet med patientens vård

2. Odling

Undvik "rundodling" generellt och odling från KADurin, om inte misstanke om urinvägsinfektion är tydlig

3. Antibiotika

Undvik att ordinera intravenös antibiotika vid pneumoni och pyelonefrit bara för att patienten läggs in. Det finns oftast fullgoda perorala alternativ

4. KAD

Avvakta med att sätta KAD om inte patienten har ihållande svårigheter med miktionen eller om exakt urinmätning inte kan utföras på annat sätt

5. Liqvor

Skicka inte rutinmässigt mikrobiologisk analys på liqvor om ingen leukocytos föreligger

4 do - börja göra

1. Tillbringa mer tid med patienten

Träffa patienten före rond och involvera patient och eventuellt anhörig i tänkt utredning och behandling

2. Öppet klimat

Främja ett öppet klimat och ifrågasätt ordinationer och undersökningar

3. Patientcentrerad vård

Individualisera utredning, behandling och kontroller. Använd riktlinjer och vårdprogram som stöd i handläggning

4. Mål och uppföljning

Tydliggör målet med varje undersökning, ordination eller kontroll och följ upp de målen vid varje rond